

von ICD-10 zu ICD-11

Josef E. Brandenberg Präsident der FMCH



ICD in der Orthopädie und Chirurgie

Wer braucht ICD?

- Codierer
- Gutachten immer mehr Versicherungen verlangen ICD
- Zukünftig im elektronischen Patienten-Dossier EPD



Was ist neu bei ICD-11

• Vor allem Psychiatrie betroffen, div. «neue Krankheiten»

• Bewegungsapparat: siehe Vortrag Jörg Jeger

Chronische Schmerzsyndrome



• 43-jähriger Bauarbeiter stürzt von der Leiter

• Rechter Fuss: Frakturen Naviculare, Cuboid, Calcaneus-Vorderhorn

• Linker Fuss: Frakturen Lisfranc 1. bis 4 Strahl, Basis Metatarsale I



Rechter Fuss: Konservative Behandlung mit Gips

• Linker Fuss: Draht-Spickung Lisfranc Platten-Osteosynthese

Metatarsale I



• Rechter Fuss: ossäre Heilung mit Arthrose des Chopart-Gelenkes

• Linker Fuss: ossäre Konsolidation, CRPS




• Kapitel 22: Frakturen

• Kapitel 15: Arthrose des Chopart

• Kapitel 08: CRPS







Chopart-Arthrose

Kapitel 15: Osteoarthritis (Arthrose)

• FA 03: Osteoarthritis of other specified joint.

• FA 03.1: posttraumatic OA of other specified joint.

• XA4JJ1: Calcaneo-cuboid joint



Lisfranc-Fraktur

Kapitel 22: Injury, poisoning and other consequences of

external causes

• ND13.3: fracture of metatarsal bone

• 27 Untergruppen: XJ69V: dislocated fracture.



Lisfranc-Fraktur

Auf Wunsch: wahlweise rechts, links, bilateral

• Zusätzlich: offene oder geschlossene Fraktur



CRPS

• Kapitel 08: Deseases of the nervous system

• 8d8A.0: Complex regional pain syndrom

• 8D8A.00: Complex regional pain syndrom Typ I